
Examiner les degrés
d'auto-sensibilisation aux facteurs de
risque d'importantes maladies
pulmonaires parmi les Canadien-nes
les plus vulnérables

Octobre 2010

Ordre du jour

Principaux constats

Introduction

Objectifs du projet

Résultats du sondage

Méthodologie

Cancer du poumon

Maladie pulmonaire
obstructive chronique
(MPOC)

THE  LUNG ASSOCIATION™
L'ASSOCIATION PULMONAIRE

Apnée du sommeil

Exposition au tabac

Fumée secondaire

Exposition à la marijuana

Attitudes

Comportements

Conclusion

Principaux constats

1. 13 % des Canadiens vulnérables à la MPOC ne connaissent pas l'expression « maladie pulmonaire obstructive chronique » ni l'acronyme « MPOC »
2. 60 % des personnes vulnérables à la MPOC connaissent peu ou pas du tout cette maladie
3. Plus du quart des Canadiens vulnérables à la MPOC ne savent pas, ou sont en désaccord avec l'affirmation, que l'exposition au tabac est une cause de la maladie
4. L'exposition à la fumée du tabac est le facteur de risque identifié chez environ les deux tiers des individus vulnérables à la MPOC et au cancer du poumon

Principaux constats (suite)

5. Les fumeurs sont moins informés que les non-fumeurs sur les causes et symptômes du cancer du poumon
6. On observe un manque de sensibilisation général à l'impact des choix liés au mode de vie
7. 18 % des fumeurs fument dans la maison en présence d'un enfant, et 35 % en présence d'un adulte non fumeur
8. 8 % des fumeurs fument dans la voiture en présence d'un enfant, et 21 % en présence d'un adulte non fumeur
9. Seulement 1 Canadien sur 5 vulnérable au cancer du poumon, à la MPOC ou à l'apnée du sommeil croit qu'il devrait mieux prendre soin de lui

Principaux constats (suite)

10. Moins de 1 Canadien vulnérable sur 5 est fortement incité par sa famille ou son médecin à changer ses habitudes de santé
11. Les Canadiens sont raisonnablement sensibilisés aux facteurs de risque et aux symptômes du cancer du poumon et de l'apnée du sommeil (72 % et 56 %, respectivement)
12. Il n'y a aucune différence significative dans la sensibilisation aux facteurs de risque, aux symptômes et aux attitudes à l'égard des trois maladies, entre les Premières Nations, les Inuits et les Métis et la population générale

Ordre du jour

Principaux constats

Introduction

Objectifs du projet

Résultats du sondage

Méthodologie

Cancer du poumon

**Maladie pulmonaire
obstructive chronique
(MPOC)**

Apnée du sommeil

Exposition au tabac

Fumée secondaire

**Exposition à la
marijuana**

Attitudes

Comportements

Conclusion

Introduction

- Cette enquête a utilisé une méthodologie de sondage pour examiner l'auto-sensibilisation aux facteurs de risque d'importantes maladies pulmonaires, dans une population canadienne parmi les plus vulnérables
- Maladies examinées : cancer du poumon, MPOC et apnée du sommeil
- Sondage réalisé par Léger Marketing
- Enquête dirigée par l'Association pulmonaire du Canada, en collaboration avec un comité consultatif

Introduction (suite)

- Comité consultatif composé de représentants :
 - de la Société canadienne de thoracologie (SCT)
 - des Professionnels canadiens en santé respiratoire (PCSR)
 - de Lung Cancer Canada
 - du COPD Canada Patient Network
 - des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Ordre du jour

Principaux constats

Apnée du sommeil

Introduction

Exposition au tabac

Objectifs du projet

Fumée secondaire

Résultats du sondage

**Exposition à la
marijuana**

Méthodologie

Attitudes

Cancer du poumon

Comportements

**Maladie pulmonaire
obstructive chronique
(MPOC)**

Conclusion

Objectifs du projet

- Mener un sondage auprès de Canadiens vulnérables au cancer du poumon, à la MPOC et à l'apnée du sommeil
- Pour mieux comprendre :
 - leurs perceptions des symptômes et des facteurs de risque
 - leurs attitudes à l'égard des choix de mode de vie qui les exposent à un risque et des options pour réduire leur risque de développer ces maladies
 - leurs perceptions à l'égard des maladies et des personnes qui en sont atteintes
- Afin de mieux prévenir, prendre en charge et traiter le cancer du poumon, la MPOC et l'apnée du sommeil

Ordre du jour

Principaux constats

Apnée du sommeil

Introduction

Exposition au tabac

Objectifs du projet

Fumée secondaire

Résultats du sondage

**Exposition à la
marijuana**

Méthodologie

Attitudes

Cancer du poumon

Comportements

**Maladie pulmonaire
obstructive chronique
(MPOC)**

Conclusion

Résultats du sondage

- Servir de fondement aux programmes d'éducation et de sensibilisation ciblant la population vulnérable
- Rehausser la compréhension, parmi la communauté des soins respiratoires et les responsables des politiques, des manières de susciter des changements positifs au sein de cette population vulnérable
- Les résultats complets du sondage sont accessibles sur le site Internet de la Société canadienne de thoracologie, à http://www.poumon.ca/cts-sct/home-accueil_f.php

Ordre du jour

Principaux constats

Apnée du sommeil

Introduction

Exposition au tabac

Objectifs du projet

Fumée secondaire

Résultats du sondage

**Exposition à la
marijuana**

Méthodologie

Attitudes

Cancer du poumon

Comportements

**Maladie pulmonaire
obstructive**

Conclusion

chronique (MPOC)

Méthodologie

- Léger Marketing a réalisé un sondage quantitatif auprès d'un échantillon représentatif de Canadiens vulnérables au cancer du poumon, à la MPOC ou à l'apnée du sommeil
- 3 036 participants admissibles ont complété le sondage – 750 par téléphone et 2 286 sur Internet
- 115 représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont été inclus dans le sondage
- Sondage réalisé entre le 12 et le 28 avril 2010

Ordre du jour

Principaux constats

Apnée du sommeil

Introduction

Exposition au tabac

Objectifs du projet

Fumée secondaire

Résultats du sondage

**Exposition à la
marijuana**

Méthodologie

Attitudes

Cancer du poumon

Comportements

**Maladie pulmonaire
obstructive chronique
(MPOC)**

Conclusion

Cancer du poumon


- Deux tiers des Canadiens vulnérables au cancer du poumon le sont en raison de l'exposition à la fumée du tabac

	Facteurs de risque
Exposition à la poussière, aux produits chimiques, à l'amiante ou au radon	48 %
Personnes qui ont cessé de fumer (qui ont fumé l'équivalent d'un paquet par jour pendant 10 ans)	29 %
Personnes qui fument actuellement	27 %
Personnes qui sont exposées à la fumée secondaire (celles qui ne fument pas personnellement mais qui vivent avec un fumeur)	9 %
Essoufflement/sifflement	22 %
Bronchite chronique	5 %
Toux chronique	4 %
Infections thoraciques fréquentes/prolongées	2 %
Antécédents personnels de cancer du poumon	1 %

} 2/3

Cancer du poumon – Sensibilisation

- La plupart des Canadiens vulnérables au cancer du poumon déclarent avoir des connaissances au moins passables sur la maladie



Cancer du poumon – Causes


- Les personnes vulnérables au cancer du poumon sont largement sensibilisées aux faits que :
 1. L'usage du tabac est le principal facteur de risque de la maladie
 2. L'exposition à l'amiante, au radon, aux poussières et aux substances chimiques est associée au cancer du poumon
 3. Les antécédents familiaux sont un facteur de risque du cancer du poumon

Cancer du poumon – Causes (suite)

- Les personnes vulnérables au cancer du poumon sont moins sensibilisées aux faits que :
 1. Des facteurs de risque sont associés à l'usage de produits de rechange du tabac comme la marijuana et les cigarillos
 2. Ils ont le pouvoir de réduire leur risque de développer la maladie
 3. Même s'ils réduisent leurs facteurs de risque, il est quand même possible qu'ils développent le cancer du poumon

Cancer du poumon - Symptômes

- La plupart des Canadiens vulnérables sont capables d'identifier les principaux symptômes de la maladie




* N'est pas un réel symptôme du cancer du poumon

Cancer du poumon – Fumeurs vs non-fumeurs

- Les fumeurs démontrent une plus grande connaissance générale du cancer du poumon, mais sont en réalité moins sensibilisés que les non-fumeurs lorsque interrogés spécifiquement sur les symptômes et les causes du cancer du poumon


Cancer du poumon – Fumeurs vs non-fumeurs

➤ Les fumeurs sont moins sensibilisés que les non-fumeurs aux symptômes du cancer du poumon



Cancer du poumon – Fumeurs vs non-fumeurs

➤ Les fumeurs sont moins sensibilisés que les non-fumeurs aux causes du cancer du poumon



Ordre du jour

Principaux constats

Introduction

Objectifs du projet

Résultats du sondage

Méthodologie

Cancer du poumon

**Maladie pulmonaire
obstructive chronique
(MPOC)**

Apnée du sommeil

Exposition au tabac

Fumée secondaire

**Exposition à la
marijuana**

Attitudes

Comportements

Conclusion

MPOC

- Les principaux facteurs de risque de la MPOC relèvent du comportement
- 69 % des Canadiens vulnérables à la MPOC le sont en raison de l'exposition à la fumée du tabac
- Près de la moitié des personnes vulnérables sont exposées à des poussières ou à des substances chimiques en milieu de travail
- Les autres risques comportementaux incluent l'usage de marijuana (passé 24 %; actuel 12 %) et la fumée de bois de chauffage à l'intérieur (14 %)

MPOC – Sensibilisation

- 13 % ne connaissent pas l'expression « maladie pulmonaire obstructive chronique » ni l'acronyme « MPOC »
- Les Canadiens vulnérables à la MPOC, à l'emphysème et à la bronchite chronique ne connaissent pas bien la maladie
- 60 % connaissent peu ou ne connaissent pas du tout la maladie
- Seulement 39 % connaissent au moins un peu la maladie sous un de ses trois noms (y compris l'emphysème et la bronchite chronique)
- Les femmes, les personnes plus âgées (de 55 à 65 ans) et les fumeurs, actuels et anciens, sont mieux informés sur la maladie

MPOC – Causes

- Plus du quart des personnes vulnérables à la MPOC (27 %) ne savent pas (22 %), ou sont en désaccord avec l'affirmation (5 %), que l'exposition au tabac cause la MPOC
- Le quart des répondants sont incertains des autres causes potentielles de la MPOC, comme l'usage de marijuana et de cigarillos, la fumée secondaire ou le tabagisme occasionnel

MPOC – Causes (suite)


- Le tiers des répondants croient que l'exposition occasionnelle à la fumée du tabac (cigarettes ou cigarillos) peut causer la MPOC
- Ceux qui n'ont jamais fumé sont plus susceptibles de croire que les ex-fumeurs ont encore un risque de MPOC
- Les personnes vulnérables à la MPOC considèrent que l'exposition à des poussières ou substances chimiques (53 %), les antécédents familiaux (43 %) ou les antécédents personnels d'asthme (40 %) sont des causes plus probables de MPOC que l'exposition à la marijuana (17 %), à la fumée de bois de chauffage (34 %) ou à la fumée de tabac occasionnelle (29 %)

MPOC – Causes (suite)

- Près du tiers des Canadiens vulnérables à la MPOC sont exposés plus d'une fois par mois à la fumée intérieure d'un poêle à bois ou d'un foyer
- Le tiers des répondants sont d'accord avec le fait que cette exposition pourrait être une cause de MPOC, mais 24 % ne savent pas, 8 % sont en désaccord et 34 % sont neutres

MPOC – Symptômes

- En dépit du manque général de connaissances sur la MPOC, plusieurs personnes vulnérables sont sensibilisées aux symptômes importants




MPOC – Responsabilité personnelle

- Faible sensibilisation à la responsabilité personnelle
- 36 % sont d'accord avec l'affirmation que les personnes qui fumaient beaucoup et qui ont arrêté ont encore un risque élevé de MPOC
- 41 % ne savent pas, ou sont en désaccord avec l'affirmation, que le corps redevient en santé quelques années après avoir arrêté de fumer
- Un peu moins de 50 % ne savent pas ou ne croient pas qu'il existe un traitement contre la MPOC

MPOC – Responsabilité personnelle

Responsabilité personnelle quant au fait d'avoir la MPOC - En accord



Ordre du jour

Principaux constats	Apnée du sommeil
Introduction	Exposition au tabac
Objectifs du projet	Fumée secondaire
Résultats du sondage	Exposition à la marijuana
Méthodologie	Attitudes
Cancer du poumon	Comportements
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	Conclusion

Apnée du sommeil

- Plus de la moitié des Canadiens vulnérables à l'apnée du sommeil le sont en raison de ronflements sévères
- La moitié des Canadiens interrogés ont déclaré avoir de forts ronflements




Apnée du sommeil – Sensibilisation

- 56 % des personnes vulnérables à l'apnée du sommeil déclarent avoir des connaissances au moins passables sur la maladie
- Les femmes sont plus sensibilisées que les hommes aux symptômes et aux causes


Apnée du sommeil – Sensibilisation

- Alors que les hommes sont plus vulnérables à l'apnée du sommeil, les femmes sont plus sensibilisées aux symptômes




Apnée du sommeil – Sensibilisation (suite)

- Les femmes sont plus sensibilisées que les hommes aux causes de l'apnée du sommeil



Apnée du sommeil – Sensibilisation (suite)

- Les personnes vulnérables à l'apnée du sommeil sont sensibilisées aux principaux symptômes mais connaissent moins les autres symptômes comme les maux de tête matinaux, la dépression et l'hypertension artérielle




Apnée du sommeil – Causes

- Moins de connaissance des causes que des symptômes de l'apnée du sommeil
- 50 % savent que le surplus de poids peut être une cause mais sont en désaccord avec le fait que la perte de poids réglerait le problème à elle seule
- Incertitude quant aux autres causes
- Plusieurs croient que l'asthme est une cause potentielle, comparativement à une inflammation des amygdales, à un cou large ou à une mâchoire sous-développée

Apnée du sommeil – Traitement

- La plupart des répondants sont d'accord avec le fait que l'apnée du sommeil est un problème médical grave qui nécessite un traitement
- On note une incertitude quant aux dangers de l'apnée du sommeil



Ordre du jour

Principaux constats	Apnée du sommeil
Introduction	Exposition au tabac
Objectifs du projet	Fumée secondaire
Résultats du sondage	Exposition à la marijuana
Méthodologie	Attitudes
Cancer du poumon	Comportements
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	Conclusion

Exposition au tabac

- Interrogés sur leur comportement lié au tabagisme, 22 % des Canadiens ont déclaré fumer régulièrement ou à l'occasion des cigarettes, des cigares, la pipe, des cigarillos ou d'autres produits du tabac
- Sur le plan démographique :
 - Les fumeurs sont plus susceptibles d'être âgés de 18 à 34 ans (33 %), d'ascendance des Premières Nations, Inuits et Métis (PNIM) (31 %) et célibataires (30 %)
 - Au palier régional, les résidents de l'Ontario, du Québec (23 % chaque) et de l'Alberta (26 %) sont plus susceptibles d'être fumeurs que ceux des Prairies (16 %)

Exposition au tabac (suite)

- Pratiquement tous les fumeurs ou ex-fumeurs ont déclaré qu'ils avaient fumé la cigarette (98 %)
- Le tiers des fumeurs ont déjà fumé des cigarillos
- Le taux d'usage des cigarillos est plus élevé parmi les jeunes Canadiens
- Presque la moitié (45 %) des 18 à 34 ans ont déjà fumé des cigarillos, et 7 % en fument encore

	Personnes qui fument actuellement ou le faisaient
Cigarettes	98 %
Cigares	42 %
Cigarillos	36 %
Pipe	24 %

Ordre du jour

Principaux constats	Apnée du sommeil
Introduction	Exposition au tabac
Objectifs du projet	Fumée secondaire
Résultats du sondage	Exposition à la marijuana
Méthodologie	Attitudes
Cancer du poumon	Comportements
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	Conclusion

Fumée secondaire

- Parmi les fumeurs, 35 % fument dans la maison en présence d'un adulte non fumeur
- 18 % fument dans la maison en présence d'un enfant
- 21 % fument dans la voiture en présence d'un adulte non fumeur
- 8 % fument dans la voiture en présence d'un enfant

Ordre du jour

Principaux constats	Apnée du sommeil
Introduction	Exposition au tabac
Objectifs du projet	Fumée secondaire
Résultats du sondage	Exposition à la marijuana
Méthodologie	Attitudes
Cancer du poumon	Comportements
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	Conclusion

Exposition à la marijuana

- Un fumeur sur dix fume de la marijuana régulièrement ou à l'occasion
- Sur le plan démographique :
 - Les fumeurs de marijuana sont le plus souvent âgés de 18 à 34 ans (21 %), célibataires (17 %, contre 7 % mariés) et fumeurs de tabac (21 % actuels, contre 8 % anciens et 4 % n'ayant jamais fumé de tabac)

Ordre du jour

Principaux constats	Apnée du sommeil
Introduction	Exposition au tabac
Objectifs du projet	Fumée secondaire
Résultats du sondage	Exposition à la marijuana
Méthodologie	Attitudes
Cancer du poumon	Comportements
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	Conclusion


Attitudes – Tabagisme

- La majorité des Canadiens voient le tabagisme comme une dépendance très difficile à vaincre (77 %)
 - Les plus jeunes, de 18 à 44 ans, sont plus susceptibles de voir le tabagisme comme une habitude que l'on peut abandonner, comparativement aux personnes de 45 à 64 ans qui le voient plus comme une dépendance
 - Au plan régional, il est plus probable, sur le plan statistique, que les résidents des Maritimes et du Québec (80 % chaque) voient le tabagisme comme une dépendance très difficile à vaincre

Attitudes – Trois maladies

- De façon générale, on note peu d'attitudes négatives à l'égard des personnes atteintes de cancer du poumon, de MPOC ou d'apnée du sommeil
- Si on compare les trois maladies, on note un plus grand stigmatisme lié au cancer du poumon – i.e., les patients atteints de cette maladie le sont par leur faute
- Il y a peu de stigmatisme lié à la MPOC (12 %), mais une plus grande proportion de répondants ne savaient pas ou étaient neutres, à cet égard (33 % et 28 % respectivement)
- L'apnée du sommeil est la moins stigmatisée des trois maladies – 43 % n'y voyaient pas de stigmatisme, 24 % étaient neutres et 23 % ne savaient pas

Attitudes – Cancer du poumon




Ordre du jour

Principaux constats	Apnée du sommeil
Introduction	Exposition au tabac
Objectifs du projet	Fumée secondaire
Résultats du sondage	Exposition à la marijuana
Méthodologie	Attitudes
Cancer du poumon	Comportements
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	Conclusion

Comportements

- Seulement un cinquième des personnes vulnérables considèrent qu'elles devraient mieux s'occuper de leur santé ou sont fortement incitées à le faire

Attitudes à l'égard de la santé personnelle



Comportements (suite)

- La plupart des Canadiens vulnérables à ces maladies sont ouverts à consulter un médecin et à parler des problèmes qui pourraient les affecter
- Le quart des répondants ne passent pas d'examens médicaux
- La plupart n'ont pas peur d'aller chez le médecin et n'hésitent pas à lui faire part de tout problème
- La plupart parleront à leur famille de ce qu'ils apprennent chez le médecin

Comportements (suite)

- Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de passer un examen médical annuel
- Les femmes tendent à ne pas tout dire à leur médecin, pour éviter de se faire sermonner (12 %, contre 9 % des hommes)
- Les femmes ont plus peur que les hommes d'aller chez le médecin, vu la possibilité d'y apprendre que quelque chose ne va pas (20 %, contre 15 % des hommes)

Ordre du jour

Principaux constats	Apnée du sommeil
Introduction	Exposition au tabac
Objectifs du projet	Fumée secondaire
Résultats du sondage	Exposition à la marijuana
Méthodologie	Attitudes
Cancer du poumon	Comportements
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	Conclusion

Conclusion

- Nous espérons que les résultats de ce sondage aideront à orienter de futures initiatives de santé comme la prévention novatrice et les options thérapeutiques, la fourniture de programmes, la recherche et les campagnes de sensibilisation du public sur le cancer du poumon, la MPOC et l'apnée du sommeil
- S.v.p., contribuez à la sensibilisation en partageant ces informations avec vos collègues de la communauté des soins respiratoires
- Pour plus d'information sur le sondage et ses résultats, veuillez consulter le site Internet de la Société canadienne de thoracologie, à http://www.poumon.ca/cts-sct/home-accueil_f.php
- Voir l'article publié dans le numéro de décembre 2010 de la Revue canadienne de pneumologie

QUESTIONS??

MERCI

DONNÉES DE BASE

Participants au sondage

- Les Canadiens sont plus susceptibles de connaître une personne atteinte de MPOC, d'apnée du sommeil ou de cancer du poumon que d'avoir eux-mêmes reçu un tel diagnostic

	Diagnostic personnel	Membre de la famille	Ami proche	Connaissance
Hypertension artérielle	27 %	48 %	13 %	10 %
Apnée du sommeil	8 %	22 %	12 %	12 %
Maladie pulmonaire obstructive chronique également appelée MPOC	3 %	9 %	4 %	5 %
Cancer du poumon	1 %	23 %	8 %	11 %
Emphysème	1 %	14 %	5 %	8 %
Bronchite chronique	4 %	11 %	5 %	5 %
Déficit Alpha 1-antitrypsine	0 %	1 %	0 %	0 %
Une infection thoracique comme une pneumonie ou une bronchite aiguë	17 %	29 %	10 %	9 %
Obésité	12 %	25 %	11 %	13 %
Maladie du cœur	7 %	42 %	10 %	10 %
Asthme	12 %	34 %	13 %	12 %
Accident vasculaire cérébral	2 %	31 %	9 %	13 %
Une autre sorte de cancer	7 %	52 %	19 %	18 %
Diabète	11 %	47 %	17 %	15 %

Définition des groupes vulnérables

FACTEURS DE RISQUE			
	Cancer du poumon	MPOC	Apnée du sommeil
Tabagisme	√	√	√
Fumée secondaire	√	√	√
Personne qui a cessé de fumer	√	√	√
Exposition à la poussière ou aux produits chimiques	√	√	
Exposition à l'amiante ou au radon	√		
Antécédents personnels	√	√	√
Antécédents familiaux	√		√
Infections thoraciques fréquentes et prolongées	√	√	
Toux chronique	√	√	
Essoufflement/sifflement	√	√	
Asthme grave ou non traité		√	
Obésité			√
Amygdales / adénoïdes enflées			√
Bronchite chronique	√	√	
Ronflements			√
Large cou ou petite mâchoire			√
Exposition à la fumée de poêles à bois		√	

Caractéristiques des participants au sondage

Characteristics	Total	Lung Cancer	COPD	Sleep Apnea
Region				
Alberta	8%	8%	8%	8%
Manitoba	4%	4%	4%	4%
New Brunswick	2%	2%	2%	2%
British Columbia	9%	9%	9%	9%
Quebec	29%	29%	29%	29%
Prince Edward Island	1%	1%	1%	1%
Saskatchewan	5%	5%	4%	5%
Newfoundland	2%	1%	2%	2%
Ontario	38%	37%	37%	37%
Nova Scotia	3%	3%	3%	3%
Northwest Territories	<1%	<1%	<1%	<1%
Type of community				
Urban	64%	62%	62	64%
Rural	37%	38%	39%	37%
Male sex				
	50%	50%	50%	51%
Age				
18-34	18%	18%	19%	17%
35-44	15%	14%	14%	14%
45-54	23%	24%	24%	24%
55-64	23%	24%	24%	24%
65 plus	20%	20%	19%	21%
Income				
<40K	23%	24%	24%	22%
\$40K-\$79K	32%	33%	33%	32%
\$80K+	26%	25%	25%	27%
Employment				
Employed full time	45%	44%	44%	45%
Employed part time	10%	10%	10%	10%
Homemaker	5%	5%	5%	5%
Student	6%	6%	6%	5%
Retired	29%	30%	29%	30%
Between jobs	4%	4%	4%	3%
Marital Status				
Married/common-law	65%	64%	64%	67%
Divorced or separated	10%	11%	11%	10%
Widowed	5%	5%	5%	5%
Single	19%	19%	19%	17%
Education				
Less than high school	29%	30%	31%	29%
College	32%	33%	33%	32%
Undergraduate degree	23%	22%	21%	22%
Graduate degree	15%	14%	13%	15%