

# 폐결핵을 예방하기 위해 약을 복용하십시오!



폐결핵 (T. B.) 양성 피부반응자를 위한  
안내문

# 결핵은 세균에 의해 생기는 병입니다


결핵을 예방하는데 왜 약이 필요합니까?

여러분이 만일 피부검사서 양성반응을 나타내거나 결핵에 걸린 이와 접촉했다든지, 아니면 여러분 자신이 과거에 결핵에 걸렸으나 충분한 치료를 받지 않았으면

여러분의 체내에 결핵균이 살아있을 수 있다는 것을 뜻합니다.

결핵은 어떻게 전염됩니까?

폐부에 결핵균을 보유하고 있는 이가 재채기나 기침을 할때 옆에서 결핵균이 섞인 공기를 마시면 전염됩니다.




그 다음엔 어떻게 됩니까?

결핵균이 체내에 들어오면 여러분의 신체가 균과 싸워서 균을 둘러싸는 벽을 세웁니다.

이 벽은 결핵균이 폐의 다른 부분이나 여타 신체부위로 옮겨가는 것을 막는 구실을 합니다.

흉부 X레이나 의사의 진단은 폐렴균이 더 이상 옮겨가지 않았음을 나타냅니다.



결핵균으로 앓을 수 있습니까?

•다른 병을 앓고 있을때나  
•스트레스를 많이 받거나  
•나이가 들면  
결핵을 둘러싼 주위의 벽이 허물어질 수 있고 세균이 퍼지게 됩니다.

약은 어떤 효능을 갖고 있습니까?

약은 벽을 허문 결핵균이 더 이상 퍼지지 전에 이들을 미리 제거하는 역할을 합니다.

어떤 약을 복용합니까?


결핵을 싸우는 약은 INH (아이소니아지드)라고 불립니다.

이 약은 알약이나 시럽처럼 마시는 두가지 종류가 있습니다. 대개 비타민 한가지 종류만 들어있는 알약을 같이 복용합니다.

약은 얼마나 오랫동안 복용해야 합니까?


결핵약은 보통 1년간 복용해야 합니다. 결핵균은 생명력이 매우 강하며 약으로 제거하는데 수개월의 시간이 소요됩니다.

약을 언제 더 이상 복용하지 않아도 되는가는 의사가 알려줄 것입니다.



약은 얼마나 자주 복용합니까?

매일 처방한대로 복용하지 않으면 효능이 없습니다.



약은 매일 같은 시간에 복용해야 합니다.



약을 복용할때 이상증세가 생길 수 있습니까?

대부분의 사람은 아무 증세를 못느끼나 이상증세를 나타낼 수도 있습니다.

만일 여러분이 약을 복용한 후

- 메스껍거나 구토를 할때
- 식욕을 잃거나
- 오줌이 검게 변하거나
- 눈이 노란색으로 변하거나
- 손끝과 발끝이 바늘로 찌르는 듯 따끔따끔한것을 느끼면 즉시 의사에게 보고하고 필요하면 찾아가십시오.

**약을 복용한 후 결핵에 걸릴 수 있습니까?**

의사가 처방한 대로 매일 약을 복용하면 결핵에 걸릴 확률은 거의 없습니다.

약을 매일 복용하지 않으면 결핵에 걸릴 수도 있습니다.

**매일 약을 복용하십시오.**

**약을 얻는데는 돈이 듭니까?**

만일 여러분의 의사가 공중보건국으로부터 약을 대신 얻어주면 무료입니다.


여러분은 3개월치에 해당하는 약을 받을 것입니다.

**약이 떨어지면 어떻게 합니까?**

약이 더 필요하면 최소한 3주전에 미리 의사에게 부탁하십시오.

의사가 여러분을 위해 무료로 약을 얻기 위해서는 충분한 시간이 필요합니다.

**FREE**



만일 결핵에 대해 궁금한 것이 있으면 여러분이 사  
시는 지역 공중보건국의 결핵담당 간호원을 찾으십  
시오.

Downtown(중부)..... 392-7420  
Eastern Health Area..... 392-0936  
Northern Health Area..... 392-0962  
Western Health Area..... 392-0884



### Public Health

Reproduced for the Department of Public Health by the Department of the  
City Clerk, Information and Communication Services Division.  
May be reproduced without permission provided proper credit is given.